

გამოყენების ინსტრუქცია  
**ვიპროსალი B<sup>®</sup>**  
(Viprosal B<sup>®</sup>)  
მაღამო გარეგანი გამოყენებისთვის

**სამკურნალო წამლო საშუალების სახელწოდება**  
ვიპროსალი B

**ზოგადი დახასიათება**

**საერთაშორისო არაპატენტური სახელწოდება:** არა აქვს

**აღწერა:** თეთრი ან თეთრი ოდნავ მოყვითალო ელფერის მაღამო ქაფურის და სკიპიდარის სუნით.

**შემადგენლობა**

1 გ მაღამო შეიცავს 0,05 საერთაშორისო ერთეულ ჩვეულებრივი გველგესლას მშრალ შხამს, 30 მგ რაცემულ ქაფურს, 30 მგ სკიპიდარს, 10 მგ სალიცილის მჟავას

**დამხმარე ნივთიერებები:** ვაზელინი, ცეტოსტეარილის სპირტი, მყარი პარაფინი, ნატრიუმის ცეტილსტეარაილსულფატი, გლიცეროლი, ნატრიუმის ქლორიდი და გასუფთავებული წყალი

**სამკურნალო წამლო ფორმა**

მაღამო გარეგანი გამოყენებისთვის

**ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი**

ადგილობრივი გამოყენების ნივთიერებები სახსროვანი და კუნთოვანი ტკივილებისას.

კოდი **ATX: M02AX**

**ფარმაკოლოგიური თვისებები**

**ფარმაკოდინამიკა**

მაღამოს ძირითად მოქმედ ნივთიერებას წარმოადგენს ჩვეულებრივი გველგესლას შხამი (*Vipera berus berus* L), რომელიც შეიცავს ფოსფოლიპაზას, ფოსფოდიესთერაზას, ჰიალურონიდაზას და სხვა აქტიურ ნივთიერებებს. გველგესლას შხამი შეიცავს ასევე სპეციფიური მოქმედების პეპტიდებს, რომლებიც არის ჰემოლიზის მიზეზი, ზრდიან კაპილარების განვლადობას, გავლენას ახდენენ სისხლის შედედებაზე. ადგილობრივი გამოყენებისას გველგესლას შხამი ახდენს გამაღიზიანებელ და ტკივილგამაყუჩებელ მოქმედებას.

მაღამო შეიცავს ასევე ნივთიერებებს, რომლებიც აღიზიანებს მგრძობიარე ნერვულ დაბოლოებებს და ამიტომ ახდენს ადგილობრივად გამაღიზიანებელ და ტკივილგამაყუჩებელ მოქმედებას. ქაფურის ტკივილგამაყუჩებელ მოქმედებასთან ერთად, სალიცილის მჟავას და სკიპიდარს გააჩნიათ ასევე ანტისეპტიური მოქმედება, ხოლო სალიცილის მჟავას ასევე კერატოლიზური მოქმედებაც.

**ფარმაკოკინეტიკა**

მაღამო სწრაფად შეიწოვება და რამდენიმე წუთის შემდეგ ჩნდება წვის შეგრძნება, კანის მსუბუქი შეწითლება და სითბოს შეგრძნება. ტკივილგამაყუჩებელი მოქმედება იწყება 20-30 წუთის შემდეგ და გრძელდება 1,5-2 საათი.

**ჩვენებები გამოყენებისათვის**

როგორც გარეგანი გამოყენების ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება რევმატული ტკივილებისას, ნევრალგიისას, რადიკულიტიისას და სხვა დაავადებებისას, თანმხლები ტკივილის სინდრომით.

**გამოყენების წესი და დოზირება**

გარეგანი გამოყენების მაღამო. მტკივნეულ უბნებზე დაიტანება მცირე პორციებით 5-10 გ (1-2 ჩაის კოვზი) მაღამო და შეიზილება კანში 1-2 ჯერ დღეში ტკივილის ინტენსივობის მიხედვით, ტკივილის სინდრომის გაქრობამდე. მკურნალობის კურსის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების ხასიათზე და ხარისხზე.

*ხანდაზმული ასაკის პაციენტები.* არ არსებობს მონაცემები იმის შესახებ, რომ ხანდაზმული ადამიანები საჭიროებენ სხვა დოზირებას.

*ბავშვები.* გამოყენება არ არის რეკომენდებული.

**გვერდითი მოქმედება**

მაღამოს კომპონენტების მიმართ კანის მომატებული მგრძობელობისას შეიძლება გაჩნდეს ქავილი, შეშუპება და ჭინჭრის ციება. ამ შემთხვევაში რეკომენდებულია მკურნალობის შეწყვეტა და მაღამოს ჩამოხანვა კანიდან. ჩამოთვლილი ნიშნები ქრება მკურნალობის შეწყვეტის შემდეგ.

გვერდითი მოვლენების თავიდან ასაცილებლად, საჭიროა წინასწარ დაიტანოს კანზე მაღამოს მცირე რაოდენობა პრეპარატის მიმართ მგრძობელობის გამოსარკვევად.

**უკუჩვენებები**

მაღამოს კომპონენტების მიმართ კანის მომატებული მგრძობელობა, წყლულები და კანის სხვა დაავადებები, ფილტვების მწვავე ტუბერკულოზი, ტვინის და კორონარული სისხლის მიმოქცევის დარღვევები, სისხლძარღვთა სპაზმების განვითარების მიმართ მიდრეკილება, თირკმლებისა და ღვიძლის ფუნქციების მძიმე დარღვევები. პრეპარატი უკუნაჩვენებია ორსულობის და ძუძუთი კვების დროს.

**ჭარბი დოზირება**

ჭარბი დოზირების შემთხვევები არ არის ცნობილი. ლორწოვან გარსებში შემთხვევით მოხვედრისას მაღამო იწვევს ძლიერ გაღიზიანებას.

**გამოყენების თავისებურებები**

მაღამო არ უნდა წაისვათ დაზიანებულ კანზე. ძლიერი გაღიზიანების თავიდან ასაცილებლად უნდა დააკვირდეთ, რომ მაღამო არ მოხვდეს თვალებში ან ლორწოვან გარსებში.

*ბავშვები და მოზარდები.* არ არის რეკომენდებული გამოყენება ბავშვებში და მოზარდებში ამ კატეგორიაში პრეპარატის გამოყენების შესახებ არასაკმარისი მონაცემების გამო.

**ორსულობა და ძუძუთი კვება**

არ შეიძლება პრეპარატის გამოყენება ორსულობის და ძუძუთი კვების დროს.

**სატრანსპორტო საშუალებების მართვის და მექანიზმების მომსახურების უნარზე ზემოქმედება**

პრეპარატი გავლენას არ ახდენს ტრანსპორტის მართვისა და ტექნიკურ მოწყობილობებთან მუშაობის უნარზე.

**სხვა სამკურნალო წამლო საშუალებებთან ურთიერთქმედება.**

არ აღინიშნება.

### **შენახვის პირობები და ვადა**

შეინახეთ არა უმეტეს 25<sup>0</sup> C ტემპერატურაზე.

არ შეინახოთ მაცივარში ან საყინულეში.

შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.

შენახვის ვადა – 3 წელი

არ გამოიყენოთ შეფუთვაში მითითებული ვარგისიანობის ვადის ამოწურვის შემდეგ.

### **გაშვების პირობები**

ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი III (გაიცემა რეცეპტის გარეშე).

### **შეფუთვა**

30 გ და 50 გ მაღამო ალუმინის ტუბში მოთავსებული მუყაოს კოლოფში გამოყენების ინსტრუქციასთან ერთად.

### **სარეგისტრაციო მოწმობის მფლობელი**

სს „გრინდექსი“, კრუსტპილსის ქ., 53, რიგა, LV-1057, ლატვია.

ტელ: +371 670083205

ფაქსი: +371 67083505

ელ.ფოსტა: [grindeks@grindeks.lv](mailto:grindeks@grindeks.lv)

### **მწარმოებელი:**

სს „ტალინის ფარმაცევტული ქარხანა“, ტონდის ქ. 33, 11316 ტალინი, ესტონეთი